

Papillons de la sortie du 20/03/2025

Villeneuve-Loubet:

Lasiommata megera



Mégère atypique avec une petite pupille supplémentaire isolée peu fréquente sur le dessus de l'aile antérieure. C'est une femelle car la bande noire (dite androconiale) traversant l'aile antérieure est fine. Sa chenille se développe sur diverses graminées.

Lycaena phlaeas




Le cuivré commun: sa chenille se développe sur les oseilles.

Crambidae



Impossible de dire mieux que Crambidae (peut-être du genre *Eudonia*) pour ce petit papillon (10mm environ).

Pont du Loup *Polygonia C-album*



Le Robert-le-Diable: sa chenille se développe sur Ormes, Orties, Houblon, Saule.

Pararge aegeria



Le Tircis: sa chenille se développe sur graminées (poa). On le trouve dans les zones fraîches et ombragées.

Coenonympha pamphilus



Le Fadet commun: sa chenille se développe sur diverses graminées.

Vanessa cardui



La belle dame: sa chenille se développe sur les chardons et vipérines. Papillon migrateur qui monte d'Afrique du nord jusqu'en Europe du nord au printemps en plusieurs générations puis retourne en sens inverse à l'automne. Certaines études montreraient que le retour s'effectue d'une seule traite à une altitude plus élevée en profitant des vents. Il y aurait aussi deux populations, une qui migre à l'ouest de l'Europe et une plus à l'est.

Le specimen photographié est très usé.