

Papillons de la sortie du 27/03/2025

Antibes Fort Carré: *Pieris brassicae* (femelle)



Piéride du chou femelle à cause des deux points noirs sur l'aile antérieure. Sa chenille se développe sur Brassicacées et Capucines.

Gonepteryx cleopatra



Citron de Provence reconnaissable à la zone orangée sur l'aile antérieure. Sa chenille se développe sur Rhamnus alaternus (Nerpruns).

Lasiommata megera (femelle)



Mégère femelle car la bande noire (dite androconiale) traversant l'aile antérieure est fine. Sa chenille se développe sur diverses graminées.

Menemerus semilimbatus




Petite araignée de la famille des salticidae dont la méthode de chasse consiste à capturer les proies en sautant sur elles. Ces araignées tendent leur pattes avant vers le haut, leurs poils sensoriels détectant le passage de proies.

Coccinella septempunctata



Notre classique coccinelle à 7 points, grand prédateur de pucerons tant dans sa phase adulte que dans sa vie de larve. Les pontes sont des grappes de petits œufs jaunes alignés sous des feuilles.

Xylocopa violacea (mâle)



Le xylocope violet est une grosse abeille solitaire dite charpentière. Elle perce des galeries d'une dizaine de cm dans le bois mort pour y pondre. La ponte est organisée de sorte que les mâles émergent en premier. Seule la femelle pique. Ici on a un mâle reconnaissable aux extrémités oranges de ses antennes.

Andrena sp



Difficile d'aller au-delà de Andrène indéterminée. Les andrènes sont des abeilles sauvages solitaires.

Oxythyrea funesta



La cétoine funeste est un coléoptère printanier qui se nourrit sur les fleurs qu'il peut même consommer en bouton. Sa larve participe activement à composter les déchets végétaux.

Parc de Vaugrenier:

Nomophila noctuella



Pyrale de la luzerne (15mm): Sa chenille se développe sur Trèfle, *Polygonum* (renouée).

Chelostoma florissomne (probable)



Chélostome des renoncules: petite abeille sauvage solitaire de la famille des mégachiliidae, famille dont la caractéristique est que la brosse de collecte du pollen se situe sous l'abdomen.